Туннельные эффекты в сверхпроводниках как ключ к пониманию фундаментальных механизмов

Татьяна Евгеньевна Кузьмичева
к.ф.-м.н., старший научный
сотрудник Центра
высокотемпературной
сверхпроводимости и квантовых
материалов им. В.Л. Гинзбурга ФИАН

Литература для подготовки

1. Е.Л. Вольф. Принципы электронной туннельной спектроскопии, Киев, “Наукова думка”, 1990.
2. Туннельные явления в твердых телах, под редакцией Э. Бурштейна и С. Лундквиста, Москва, “Мир”, 1973.
3. Л. Солимар. Туннельный эффект в сверхпроводниках и его применение, Москва, “Мир”, 1974.
4. К.К. Лихарев. Введение в динамику джозефсоновских переходов, Москва, “Наука”, 1985.
5. А. Бароне, Дж. Патерно. Эффект Джозефсона. Физика и применение, Москва, “Мир”, 1984.
6. И.О. Кулик, И.К. Янсон. Эффект Джозефсона в сверх-проводящих туннельных структурах, Москва, “Наука”, 1970.

1911-1957: что известно о сверхпроводниках?

2. Сверхпроводник – идеальный проводник: ниже критической температуры T_c сопротивление обращается в ноль

1911-1957: что известно о сверхпроводниках?

Мир фермионов

Мир фермионов

$$n = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

Мир бозонов

Длины когерентности некоторых сверхпроводников

с/п	T_c , К	ξ , Å ($T \rightarrow 0$)	2Δ , мэВ
Al	1.2	15000	0.38
In	3.4	4400	1.05
Sn	3.7	2300	1.2
Pb	7.2	5100	2.75
Nb	9.2	400	3.02
Nb ₃ Ge	23	30	4.16
Bi ₂ Sr ₂ CaCu ₂ O ₈	96	16	25

Температурная зависимость энергии связи куперовской пары

$$\Delta(T) \approx \Delta_0 \sqrt{1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^3}$$

$R(T)$

При $T \rightarrow T_c$:

$$\Delta^2(T \rightarrow T_c) \approx 3\Delta_0^2 \left[1 - \frac{T}{T_c}\right]$$

$$n_s(T \rightarrow T_c) \approx 4n_{s0} \left[1 - \frac{T}{T_c}\right]$$

$$\Rightarrow \Delta^2 \sim n_s$$

Температурная зависимость энергии связи куперовской пары

Отношение величины щели при $T \rightarrow 0$ к T_c постоянно:

$$\frac{2\Delta_0}{k_B T_C} = 3.53$$

Контакт сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник

Эффект Джозефсона

$$I = I_0 \sin(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Джозефсоновский контакт – перестраиваемый генератор напряжение-частота

$$\hbar\omega = 2eV$$

$$\frac{2e}{\hbar} \approx 484 \text{ ГГц/мВ}$$

Типы точечных контактов

шарвиновский
(баллистический)

$$R_S = \frac{4\rho l}{3\pi a^2} \approx R_M \frac{l}{a}$$

промежуточный

$$R = \frac{4\rho l}{3\pi a^2} + \Gamma(K) \frac{\rho}{2a}$$

максвелловский
(термический)

$$R_M = \frac{\rho}{2a}$$

Как сделать туннельный контакт

1. Мезоструктура

2. Контакт на микротрещине "break-junction"

3. Прижимной контакт

Как сделать туннельный контакт

3. Прижимной контакт

3а. Точечный контакт

Методика разработана в 1974 году группой Янсона в Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина, (ФТИНТ) АН СССР, Харьков.

И.К. Янсон, ЖЭТФ 66, 1035 (1974)

Как сделать туннельный контакт

3-точечное подключение

4. Сканирующий туннельный микроскоп

G. Binnig, H. Rohrer, *et al.*, Appl. Phys. Lett. **40**, 178 (1982);
G. Binnig, H. Rohrer, *et al.*, Physica B **127**, 37 (1984).